

УДК 517.5

Е.А. Севостьянов (Житомирский государственный университет им. И. Франко)

Є.О. Севостьянов (Житомирський державний університет ім. І. Франко)

E.A. Sevost'yanov (Zhitomir State University of I. Franko)

Об устранении изолированных особенностей классов Орлича–Соболева с ветвлением

Про усунення ізольованих сингулярностей класів Орліча–Соболева з розгалуженням

On removability of isolated singularities of Orlicz–Sobolev classes with branching

Изучается локальное поведение замкнуто-открытых дискретных отображений классов Орлича–Соболева в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 3$. Установлено, что указанные отображения f имеют непрерывное продолжение в изолированную точку x_0 границы области $D \setminus \{x_0\}$, как только их внутренняя дилатация имеет мажоранту класса FMO (конечного среднего колебания) в указанной точке и, кроме того, предельные множества отображения f в x_0 и на ∂D не пересекаются. Другим достаточным условием возможности непрерывного продолжения указанных отображений является расходимость некоторого интеграла.

Вивчається локальна поведінка замкнуто-відкритих дискретних відображень класів Орліча–Соболева в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 3$. Встановлено, що вказані відображення мають неперервне продовження до ізольованої точки x_0 межі області $D \setminus \{x_0\}$, як тільки їх внутрішня дилатация має мажоранту класу FMO (скінченного середнього коливання) у вказаній точці і, крім того, граничні множини відображення f у x_0 и на ∂D не перетинаються. Іншою достатньою умовою можливості неперервного продовження зазначених відображень є розбіжність певного інтегралу.

A local behavior of closed open discrete mappings of Orlicz–Sobolev classes in $\mathbb{R}^n$, $n \geq 3$, is studied. It is proved that, mappings mentioned above have continuous extension to isolated boundary point x_0 of a domain $D \setminus \{x_0\}$ whenever $n - 1$ degree of its inner dilatation has FMO (finite mean oscillation) at the point and, besides that, limit sets of f at x_0 and ∂D are disjoint. Another sufficient condition of possibility of continuous extension is a divergence of some integral.

1. Введение. В настоящей заметке исследуется некоторый подкласс отображений с конечным искажением, активно изучаемых в последнее время рядом авторов (см., напр., [1], [2]–[3], [4], [5] и [6]). Всюду далее D – область в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, m – мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ и $\text{dist}(A, B)$ – евклидово расстояние между множествами A и B в $\mathbb{R}^n$, $d(x, y) := |x - y|$, $d(C)$ – евклидов диаметр множества $C \subset \mathbb{R}^n$,

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| < r\}, \quad \mathbb{B}^n := B(0, 1),$$

$$S(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| = r\}, \quad \mathbb{S}^{n-1} := S(0, 1),$$

$$A(r_1, r_2, x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : r_1 < |x - x_0| < r_2\},$$

ω_{n-1} обозначает площадь единичной сферы $\mathbb{S}^{n-1}$ в $\mathbb{R}^n$, Ω_n – объём единичного шара $\mathbb{B}^n$ в $\mathbb{R}^n$, $\overline{\mathbb{R}^n} := \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$. В дальнейшем всюду символом $\Gamma(E, F, D)$ мы обозначаем семейство всех кривых $\gamma : [a, b] \rightarrow \overline{\mathbb{R}^n}$, которые соединяют E и F в D , т.е. $\gamma(a) \in E$, $\gamma(b) \in F$ и $\gamma(t) \in D$ при $t \in (a, b)$. Запись $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ предполагает, что отображение f непрерывно в D . В дальнейшем $\mathcal{H}^k$ – нормированная k -мерная мера Хаусдорфа в $\mathbb{R}^n$, $1 \leq k \leq n$, $J(x, f) = \det f'(x)$ – *якобиан отображения* f в точке x , где $f'(x)$ – *матрица Якоби* отображения f в точке x . Здесь и далее *предельным множеством отображения f относительно множества $E \subset \overline{\mathbb{R}^n}$* называется множество $C(f, E) := \left\{y \in \mathbb{R}^n : \exists x_0 \in E : y = \lim_{m \rightarrow \infty} f(x_m), x_m \rightarrow x_0\right\}$. Напомним, что отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *замкнутым* (в других терминах – *сохраняющим границу отображением* (см. [7, разд. 3, гл. II])), если предельное множество $C(f, \partial D)$ отображения f на границе области D содержится в $\partial D'$, где $D' := f(D)$. Отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *дискретным*, если прообраз $f^{-1}(y)$ каждой точки $y \in \mathbb{R}^n$ состоит только из изолированных точек. Отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *открытым*, если образ любого открытого множества $U \subset D$ является открытым множеством в $\mathbb{R}^n$. Пусть U – открытое множество, $U \subset \mathbb{R}^n$, $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ – некоторая функция, $u \in L_{loc}^1(U)$. Предположим, что найдётся функция $v \in L_{loc}^1(U)$, такая что $\int_U \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) u(x) dm(x) = - \int_U \varphi(x) v(x) dm(x)$ для любой функции $\varphi \in C_1^0(U)$. Тогда будем говорить, что функция v является *обобщённой производной первого порядка функции u по переменной x_i* и обозначать символом: $\frac{\partial u}{\partial x_i}(x) := v$. Функция $u \in W_{loc}^{1,1}(U)$, если u имеет обобщённые производные первого порядка по каждой из переменных в U , которые являются локально интегрируемыми в U .

Пусть G – открытое множество в $\mathbb{R}^n$. Отображение $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ принадлежит *классу Соболева $W_{loc}^{1,1}(G)$* , пишут $f \in W_{loc}^{1,1}(G)$, если все координатные функции $f = (f_1, \dots, f_n)$ обладают обобщёнными частными производными первого порядка, которые локально интегрируемы в G в первой степени. Отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *отображением с конечным искажением*, пишем $f \in FD$, если $f \in W_{loc}^{1,1}(D)$ и для некоторой функции $K(x) : D \rightarrow [1, \infty)$ выполнено условие $\|f'(x)\|^n \leq K(x) \cdot |J(x, f)|$ при почти всех $x \in D$, где $\|f'(x)\| = \max_{h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{|f'(x)h|}{|h|}$ (см. [1, п. 6.3, гл. VI]. Полагаем $l(f'(x)) = \min_{h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{|f'(x)h|}{|h|}$. Отметим, что для отображений с конечным искажением корректно определена и почти всюду конечна так называемая *внутренняя дилатация $K_I(x, f)$ отображения f в*

точке x , определяемая равенствами

$$K_I(x, f) = \begin{cases} \frac{|J(x, f)|}{l(f'(x))^n}, & J(x, f) \neq 0, \\ 1, & f'(x) = 0, \\ \infty, & \text{в остальных случаях} \end{cases} \quad (1)$$

Пусть $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ – неубывающая функция, f – локально интегрируемая вектор-функция n вещественных переменных $x_1, \dots, x_n$, $f = (f_1, \dots, f_m)$, $f_i \in W_{loc}^{1,1}$, $i = 1, \dots, m$. Будем говорить, что $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ принадлежит классу $W_{loc}^{1,\varphi}$, пишем $f \in W_{loc}^{1,\varphi}$, если $\int_G \varphi(|\nabla f(x)|) dm(x) < \infty$ для любой компактной подобласти $G \subset D$,

где $|\nabla f(x)| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)^2}$. Класс $W_{loc}^{1,\varphi}$ называется классом Орлича–Соболева. Рассмотрим следующую задачу:

пусть $x_0 \in D$ и $f : D \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ – отображение класса $W_{loc}^{1,\varphi}(D \setminus \{x_0\})$ с конечным искажением, тогда при каких условиях отображение f может быть продолжено по непрерывности в точку x_0 ?

Ответ на этот вопрос в случае, когда отображение f является гомеоморфизмом был найден нами несколько ранее (см. [8, теорема 5] и [2, теорема 9.3]). Стремясь усилить этот результат, в настоящей статье мы рассматриваем более широкий класс замкнуто-открытых дискретных отображений. Ниже будет показано, что для указанного класса заключение о непрерывном продолжении в изолированную точку границы также верно, по крайней мере, в случае выполнения следующего дополнительно условия: $C(f, x_0) \cap C(f, \partial D) = \emptyset$. Разумеется, произвольные гомеоморфизмы удовлетворяют требованиям замкнутости, дискретности, открытости, а также указанному ограничению на предельные множества. С другой стороны, легко указать примеры негомеоморфных замкнуто-открытых дискретных отображений, для которых также $C(f, x_0) \cap C(f, \partial D) = \emptyset$. Таковым, например, является отображение с ограниченным искажением, называемое «закручиванием вокруг оси» и задаваемое в цилиндрических координатах в виде $f_m(x) = (r \cos m\varphi, r \sin m\varphi, x_3, \dots, x_n)$, $x = (x_1, \dots, x_n) \in D := \mathbb{B}^n$, $r = |z|$, $\varphi = \arg z$, $z = x_1 + ix_2$, $m \in \mathbb{N}$. (Здесь $x_0 = 0$). Не лишним будет отметить, что в произвольной меньшей области указанное отображение f_m при некотором m уже не замкнуто. Скажем, это относится к области $G := B(e_1/2, 1/2) \subset \mathbb{B}^n$, $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, где условие $C(f, z_0) \cap C(f, \partial G) = \emptyset$ также может нарушаться для некоторой точки $z_m \in G$ и больших m . Другой простой пример негомеоморфного замкнуто-открытого дискретного отображения, для которого ограничение $C(f, x_0) \cap C(f, \partial D) = \emptyset$ выполняется, может быть дан в виде $f(z) = z^n$, $z \in \mathbb{B}^2 \subset \mathbb{C}$, где $x_0 := 0$.

Сформулируем главный результат настоящей заметки.

Теорема 1. Пусть $n \geq 3$, $x_0 \in D$, тогда каждое открытое, дискретное и замкнутое ограниченное отображение $f : D \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ класса $W_{loc}^{1,\varphi}(D \setminus \{x_0\})$ с конечным искажением такое, что $C(f, x_0) \cap C(f, \partial D) = \emptyset$, продолжается в точку x_0 непрерывным образом до отображения $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, если

$$\int_1^\infty \left[\frac{t}{\varphi(t)} \right]^{\frac{1}{n-2}} dt < \infty \quad (2)$$

и, кроме того, найдётся функция $Q \in L^1_{loc}(D)$, такая что $K_I(x, f) \leq Q(x)$ при почти всех $x \in D$ и при некотором $\varepsilon_0 > 0$, $\varepsilon_0 < \text{dist}(x_0, \partial D)$, выполнено следующее условие расходимости интеграла:

$$\int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t q_{x_0}^{\frac{1}{n-1}}(t)} = \infty. \quad (3)$$

Здесь $q_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q(x) d\mathcal{H}^{n-1}$ обозначает среднее интегральное значение функции Q над сферой $S(x_0, r)$. В частности, заключение теоремы 1 является верным, если $q_{x_0}(r) = O\left(\left[\log \frac{1}{r}\right]^{n-1}\right)$ при $r \rightarrow 0$.

Замечание 1. Условие (2) принадлежит Кальдерону и использовалось им для решения задач несколько иного плана (см. [9]).

При $n = 2$ заключение теоремы 1 можно несколько усилить. Для этой цели введём следующие обозначения. Для комплекснозначной функции $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, заданной в области $D \subset \mathbb{C}$, имеющей частные производные по x и y при почти всех $z = x + iy$, полагаем $\bar{\partial}f = f_{\bar{z}} = (f_x + if_y)/2$ и $\partial f = f_z = (f_x - if_y)/2$. Полагаем $\mu(z) = \mu_f(z) = f_{\bar{z}}/f_z$, при $f_z \neq 0$ и $\mu(z) = 0$ в противном случае. Указанная комплекснозначная функция μ называется *комплексной дилатацией* отображения f в точке z . *Максимальной дилатацией* отображения f в точке z называется следующая функция: $K_{\mu_f}(z) = K_{\mu}(z) = \frac{1+|\mu(z)|}{|1-\mu(z)|}$. Заметим, что $J(f, z) = |f_z|^2 - |f_{\bar{z}}|^2$, где $J(f, z) := \det f'(z)$, что может быть проверено прямым подсчётом (см., напр., [10, пункт С, гл. I]). Кроме того, заметим, что $K_I(z, f) = K_{\mu}(z)$.

Теорема 2. Пусть $z_0 \in D \subset \mathbb{C}$, $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq b$, тогда каждое открытое дискретное отображение $f : D \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{a \cup b\}$ класса $W^{1,1}_{loc}$ с конечным искажением продолжается в точку z_0 непрерывным образом до отображения $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$, если найдётся функция $Q \in L^1_{loc}(D)$, такая что $K_{\mu}(z) \leq Q(z)$ при почти всех $z \in D$ и при некотором $\varepsilon_0 > 0$, $\varepsilon_0 < \text{dist}(z_0, \partial D)$, выполнено следующее условие расходимости интеграла (3), где $q_{z_0}(r) := \frac{1}{2\pi r} \int_{|z-z_0|=r} Q(z) d\mathcal{H}^1$ – среднее интегральное значение функции Q над окружностью $S(z_0, r)$. В частности, заключение теоремы 2 является верным, если $q_{z_0}(r) = O\left(\left[\log \frac{1}{r}\right]\right)$ при $r \rightarrow 0$.

2. Вспомогательные сведения, основные леммы и доказательство теоремы 1. Доказательство основного результата заметки опирается на некоторый аппарат, суть которого излагается ниже (см., напр., [2]). Напомним некоторые определения, связанные с понятием поверхности, интеграла по поверхности, а также модулей семейств кривых и поверхностей.

Пусть ω – открытое множество в $\overline{\mathbb{R}^k} := \mathbb{R}^k \cup \{\infty\}$, $k = 1, \dots, n-1$. Непрерывное отображение $S : \omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ будем называть *k-мерной поверхностью* S в $\mathbb{R}^n$. Число прообразов $N(y, S) = \text{card } S^{-1}(y) = \text{card } \{x \in \omega : S(x) = y\}$, $y \in \mathbb{R}^n$ будем называть *функцией кратности* поверхности S . Другими словами, $N(y, S)$ – кратность накрытия точки y поверхностью S . Пусть $\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}^+}$ – борелевская функция, в таком случае интеграл от функции ρ по поверхности S определяется равенством: $\int_S \rho d\mathcal{A} := \int_{\mathbb{R}^n} \rho(y) N(y, S) d\mathcal{H}^k y$.

Пусть Γ – семейство k -мерных поверхностей S . Борелевскую функцию $\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}^+$ будем называть *допустимой* для семейства Γ , сокр. $\rho \in \text{adm } \Gamma$, если

$$\int_S \rho^k d\mathcal{A} \geq 1 \quad (4)$$

для каждой поверхности $S \in \Gamma$. *Модулем* семейства Γ назовём величину $M(\Gamma) = \inf_{\rho \in \text{adm } \Gamma} \int_{\mathbb{R}^n} \rho^n(x) dm(x)$. Заметим, что модуль семейств поверхностей, определённый таким образом, представляет собой внешнюю меру в пространстве всех k -мерных поверхностей (см. [11]). Говорят, что некоторое свойство P выполнено для *почти всех поверхностей* области D , если оно имеет место для всех поверхностей, лежащих в D , кроме, быть может, некоторого их подсемейства, модуль которого равен нулю. В частности, говорят, что некоторое свойство выполнено для *почти всех кривых* области D , если оно имеет место для всех кривых, лежащих в D , кроме, быть может, некоторого их подсемейства, модуль которого равен нулю.

Будем говорить, что измеримая по Лебегу функция $\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}^+$ *обобщённо допустима* для семейства Γ k -мерных поверхностей S в $\mathbb{R}^n$, сокр. $\rho \in \text{ext adm } \Gamma$, если соотношение (4) выполнено для почти всех поверхностей S семейства Γ . *Обобщённый модуль* $\overline{M}(\Gamma)$ семейства Γ определяется равенством $\overline{M}(\Gamma) = \inf_{\rho \in \text{ext adm } \Gamma} \int_{\mathbb{R}^n} \rho^n(x) dm(x)$, где точная нижняя грань берётся по всем функциям $\rho \in \text{ext adm } \Gamma$. Очевидно, что при каждом $p \in (0, \infty)$, $k = 1, \dots, n-1$, и каждого семейства k -мерных поверхностей Γ в $\mathbb{R}^n$, выполнено равенство $\overline{M}(\Gamma) = M(\Gamma)$.

Следующий класс отображений представляет собой обобщение квазиконформных отображений в смысле кольцевого определения по Герингу ([12]) и отдельно исследуется (см., напр., [2, глава 9]). Пусть D и D' – заданные области в $\overline{\mathbb{R}}^n$, $n \geq 2$, $x_0 \in \overline{D} \setminus \{\infty\}$ и $Q : D \rightarrow (0, \infty)$ – измеримая по Лебегу функция. Будем говорить, что $f : D \rightarrow D'$ – *нижнее Q -отображение в точке x_0* , как только

$$M(f(\Sigma_\varepsilon)) \geq \inf_{\rho \in \text{ext adm } \Sigma_\varepsilon} \int_{D \cap R_\varepsilon} \frac{\rho^n(x)}{Q(x)} dm(x) \quad (5)$$

для каждого кольца $A(\varepsilon, r_0, x_0)$, $r_0 \in (0, d_0)$, $d_0 = \sup_{z \in D} |z - x_0|$, где Σ_ε обозначает семейство всех пересечений сфер $S(x_0, r)$ с областью D , $r \in (0, r_0)$. Примеры таких отображений несложно указать (см. теорему 3 ниже).

Отметим, что выражения ”почти всех кривых” и ”почти всех поверхностей” в отдельных случаях могут иметь две различные интерпретации (в частности, если речь идёт о семействе сфер, то ”почти всех” может пониматься как относительно множества значений r , так и конформного модуля семейства сфер, рассматриваемого как частный случай семейства поверхностей). Следующее утверждение вносит некоторую ясность между указанными интерпретациями и может быть установлено полностью по аналогии с [2, лемма 9.1].

Лемма 1. Пусть $x_0 \in D$. Если некоторое свойство P имеет место для почти всех сфер $D(x_0, r) := S(x_0, r) \cap D$, где ”почти всех” понимается в смысле модуля семейств

поверхностей, то P также имеет место для почти всех сфер $D(x_0, r)$ относительно линейной меры Лебега по параметру $r \in \mathbb{R}$. Обратно, пусть P имеет место для почти всех сфер $D(x_0, r) := S(x_0, r) \cap D$ относительно линейной меры Лебега по $r \in \mathbb{R}$, тогда P также имеет место для почти всех поверхностей $D(x_0, r) := S(x_0, r) \cap D$ в смысле модуля семейств поверхностей.

Следующее утверждение облегчает проверку бесконечной серии неравенств в (5) и может быть установлено аналогично доказательству [2, теорема 9.2].

Лемма 2. Пусть $D, D' \subset \overline{\mathbb{R}^n}$, $x_0 \in \overline{D} \setminus \{\infty\}$ и $Q : D \rightarrow (0, \infty)$ – измеримая по Лебегу функция. Отображение $f : D \rightarrow D'$ является нижним Q -отображением в точке x_0 тогда и только тогда, когда $M(f(\Sigma_\varepsilon)) \geq \int_\varepsilon^{r_0} \frac{dr}{\|Q\|_{n-1}(r)} \quad \forall \varepsilon \in (0, r_0), r_0 \in (0, d_0)$, где, как и выше, Σ_ε обозначает семейство всех пересечений сфер $S(x_0, r)$ с областью D , $r \in (\varepsilon, r_0)$, $\|Q\|_{n-1}(r) = \left(\int_{D(x_0, r)} Q^{n-1}(x) d\mathcal{A} \right)^{\frac{1}{n-1}}$ – L_{n-1} -норма функции Q над сферой $D(x_0, r) = \{x \in D : |x - x_0| = r\} = D \cap S(x_0, r)$.

Напомним, что конденсатором называют пару $E = (A, C)$, где A – открытое множество в $\mathbb{R}^n$, а C – компактное подмножество A . Ёмкостью конденсатора E называется следующая величина: $\text{cap } E = \text{cap } (A, C) = \inf_{u \in W_0(E)} \int_A |\nabla u(x)|^n dm(x)$, где $W_0(E) = W_0(A, C)$ – семейство неотрицательных непрерывных функций $u : A \rightarrow \mathbb{R}$ с компактным носителем в A , таких что $u(x) \geq 1$ при $x \in C$ и $u \in ACL$. Здесь, как обычно, $|\nabla u| = \left(\sum_{i=1}^n (\partial_i u)^2 \right)^{1/2}$. Следующее утверждение имеет важное значение для доказательства многих результатов настоящей работы (см. [13, предложение 10.2, гл. II]).

Предложение 1. Пусть $E = (A, C)$ – произвольный конденсатор в $\mathbb{R}^n$ и пусть Γ_E – семейство всех кривых вида $\gamma : [a, b] \rightarrow A$ таких, что $\gamma(a) \in C$ и $|\gamma| \cap (A \setminus F) \neq \emptyset$ для произвольного компакта $F \subset A$. Тогда $\text{cap } E = M(\Gamma_E)$.

Следующие важные сведения, касающиеся ёмкости пары множеств относительно области, могут быть найдены в работе В. Цимера [14]. Пусть G – ограниченная область в $\mathbb{R}^n$ и C_0, C_1 – непересекающиеся компактные множества, лежащие в замыкании G . Полагаем $R = G \setminus (C_0 \cup C_1)$ и $R^* = R \cup C_0 \cup C_1$. Конформной ёмкостью пары C_0, C_1 относительно замыкания G называется величина $C[G, C_0, C_1] = \inf_R \int |\nabla u|^n dm(x)$, где точная нижняя грань берётся по всем функциям u , непрерывным в R^* , $u \in ACL(R)$, таким что $u = 1$ на C_1 и $u = 0$ на C_0 . Указанные функции будем называть допустимыми для величины $C[G, C_0, C_1]$. Мы будем говорить, что множество $\sigma \subset \mathbb{R}^n$ разделяет C_0 и C_1 в R^* , если $\sigma \cap R$ замкнуто в R и найдутся непересекающиеся множества A и B , являющиеся открытыми в $R^* \setminus \sigma$, такие что $R^* \setminus \sigma = A \cup B$, $C_0 \subset A$ и $C_1 \subset B$. Пусть Σ обозначает класс всех множеств, разделяющих C_0 и C_1 в R^* . Для числа $n' = n/(n-1)$ определим величину

$$\widetilde{M}_{n'}(\Sigma) = \inf_{\rho \in \text{adm } \Sigma} \int_{\mathbb{R}^n} \rho^{n'} dm(x),$$

где запись $\rho \in \widetilde{\text{adm}} \Sigma$ означает, что ρ – неотрицательная борелевская функция в $\mathbb{R}^n$

такая, что

$$\int_{\sigma \cap R} \rho d\mathcal{H}^{n-1} \geq 1 \quad \forall \sigma \in \Sigma.$$

Заметим, что согласно результату Цимера

$$\widetilde{M}_{n'}(\Sigma) = C[G, C_0, C_1]^{-1/(n-1)}, \quad (6)$$

см. [14, теорема 3.13]. Заметим также, что согласно результату Хессе

$$M(\Gamma(E, F, D)) = C[D, E, F], \quad (7)$$

как только $(E \cap F) \cap \partial D = \emptyset$, см. [15, теорема 5.5].

Напомним, что отображение $f : X \rightarrow Y$ между пространствами с мерами (X, Σ, μ) и (Y, Σ', μ') обладает N -свойством (Лузина), если из условия $\mu(S) = 0$ следует, что $\mu'(f(S)) = 0$. Следующее вспомогательное утверждение получено в работе [8] (см. теорема 1 и следствие 2).

Предложение 2. Пусть D – область в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 3$, $\varphi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ – неубывающая функция, удовлетворяющая условию (2). Тогда:

1) Если $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ – непрерывное открытое отображение класса $W_{loc}^{1,\varphi}(D)$, то f имеет почти всюду полный дифференциал в D ;

2) Любое непрерывное отображение $f \in W_{loc}^{1,\varphi}$ обладает N -свойством относительно $(n-1)$ -мерной меры Хаусдорфа, более того, локально абсолютно непрерывно на почти всех сферах $S(x_0, r)$ с центром в заданной предписанной точке $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Кроме того, на почти всех таких сферах $S(x_0, r)$ выполнено условие $\mathcal{H}^{n-1}(f(E)) = 0$, как только $|\nabla f| = 0$ на множестве $E \subset S(x_0, r)$. (Здесь "почти всех" понимается относительно линейной меры Лебега по параметру r).

Для отображения $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, множества $E \subset D$ и $y \in \mathbb{R}^n$, определим функцию кратности $N(y, f, E)$ как число прообразов точки y во множестве E , т.е.

$$N(y, f, E) = \text{card} \{x \in E : f(x) = y\}, \quad N(f, E) = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} N(y, f, E). \quad (8)$$

Обозначим через $J_{n-1}f(a)$ величину, означающую $(n-1)$ -мерный якобиан отображения f в точке a (см. [16, раздел 3.2.1]). Предположим, что отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифференцируемо в точке $x_0 \in D$ и матрица Якоби $f'(x_0)$ невырождена, $J(x_0, f) = \det f'(x_0) \neq 0$. Тогда найдутся системы векторов $e_1, \dots, e_n$ и $\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n$ и положительные числа $\lambda_1(x_0), \dots, \lambda_n(x_0)$, $\lambda_1(x_0) \leq \dots \leq \lambda_n(x_0)$, такие что $f'(x_0)e_i = \lambda_i(x_0)\tilde{e}_i$ (см. [17, теорема 2.1 гл. I]), при этом,

$$|J(x_0, f)| = \lambda_1(x_0) \dots \lambda_n(x_0), \quad \|f'(x_0)\| = \lambda_n(x_0), \quad l(f'(x)) = \lambda_1(x_0), \quad (9)$$

$$K_I(x_0, f) = \frac{\lambda_1(x_0) \dots \lambda_n(x_0)}{\lambda_1^n(x_0)}, \quad (10)$$

см. [17, соотношение (2.5), разд. 2.1, гл. I]. Числа $\lambda_1(x_0), \dots, \lambda_n(x_0)$ называются *главными значениями*, а вектора $e_1, \dots, e_n$ и $\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n$ – *главными векторами* отображения $f'(x_0)$.

Из геометрического смысла $(n - 1)$ -мерного якобиана, а также первого соотношения в (9) вытекает, что

$$\lambda_1(x_0) \cdots \lambda_{n-1}(x_0) \leq J_{n-1}f(x_0) \leq \lambda_2(x_0) \cdots \lambda_n(x_0), \quad (11)$$

в частности, из (11) следует, что $J_{n-1}f(x_0)$ положителен во всех тех точках x_0 , где положителен якобиан $J(x_0, f)$.

Следующие два утверждения несут в себе основную смысловую нагрузку данной заметки. Первое из них впервые установлено для случая гомеоморфизмов в работе [18] (см. теорему 2.1).

Лемма 3. Пусть D – область в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 3$, $\varphi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ – неубывающая функция, удовлетворяющая условию (2). Если $n \geq 3$, то каждое открытое дискретное отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ с конечным искажением класса $W_{loc}^{1,\varphi}$ такое, что $N(f, D) < \infty$, является нижним Q -отображением в каждой точке $x_0 \in \overline{D}$ при $Q(x) = N(f, D) \cdot K_I^{\frac{1}{n-1}}(x, f)$, где внутренняя дилатация $K_I(x, f)$ отображения f в точке x определена соотношением (1), а кратность $N(f, D)$ определена вторым соотношением в (8).

Доказательство. Заметим, что f дифференцируемо почти всюду ввиду предложения 2. Пусть B – борелево множество всех точек $x \in D$, в которых f имеет полный дифференциал $f'(x)$ и $J(x, f) \neq 0$. Применяя теорему Кирсбрауна и свойство единственности аппроксимативного дифференциала (см. [16, пункты 2.10.43 и 3.1.2]), мы видим, что множество B представляет собой не более чем счётное объединение борелевских множеств B_l , $l = 1, 2, \dots$, таких, что сужения $f_l = f|_{B_l}$ являются билипшецевыми гомеоморфизмами (см., напр., [16, пункты 3.2.2, 3.1.4 и 3.1.8]). Без ограничения общности, мы можем полагать, что множества B_l попарно не пересекаются. Обозначим также символом B_* множество всех точек $x \in D$, в которых f имеет полный дифференциал, однако, $f'(x) = 0$.

Ввиду построения, множество $B_0 := D \setminus (B \cup B_*)$ имеет лебегову меру нуль. Следовательно, по [2, теорема 9.1], $\mathcal{H}^{n-1}(B_0 \cap S_r) = 0$ для почти всех сфер $S_r := S(x_0, r)$ с центром в точке $x_0 \in \overline{D}$, где "почти всех" следует понимать в смысле конформного модуля семейств поверхностей. По лемме 1 также $\mathcal{H}^{n-1}(B_0 \cap S_r) = 0$ при почти всех $r \in \mathbb{R}$.

По предложению 2 и из условия $\mathcal{H}^{n-1}(B_0 \cap S_r) = 0$ для почти всех $r \in \mathbb{R}$ вытекает, что $\mathcal{H}^{n-1}(f(B_0 \cap S_r)) = 0$ для почти всех $r \in \mathbb{R}$. По этому предложению также $\mathcal{H}^{n-1}(f(B_* \cap S_r)) = 0$, поскольку f – отображение с конечным искажением и, значит, $\nabla f = 0$ почти всюду, где $J(x, f) = 0$.

Пусть Γ – семейство всех пересечений сфер S_r , $r \in (\varepsilon, r_0)$, $r_0 < d_0 = \sup_{x \in D} |x - x_0|$, с областью D . Для заданной функции $\rho_* \in \text{adm } f(\Gamma)$, $\rho_* \equiv 0$ вне $f(D)$, полагаем $\rho \equiv 0$ вне D и на B_0 ,

$$\rho(x) := \rho_*(f(x)) \left(|J(x, f)| \cdot K_I^{\frac{1}{n-1}}(x, f) \right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{при } x \in D \setminus B_0.$$

Учитывая соотношения (9) и (11),

$$\rho(x) \geq \rho_*(f(x))(J_{n-1}f(x))^{\frac{1}{n-1}}. \quad (12)$$

Пусть $D_r^* \in f(\Gamma)$, $D_r^* = f(D \cap S_r)$. Заметим, что $D_r^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} f(S_r \cap B_i) \cup f(S_r \cap B_*)$ и, следовательно, для почти всех $r \in (0, r_0)$

$$\begin{aligned} 1 \leq \int_{D_r^*} \rho_*^{n-1}(y) d\mathcal{A}_* &\leq \sum_{i=0}^{\infty} \int_{f(S_r \cap B_i)} \rho_*^{n-1}(y) N(y, S_r \cap B_i) d\mathcal{H}^{n-1}y + \\ &+ \int_{f(S_r \cap B_*)} \rho_*^{n-1}(y) N(y, S_r \cap B_*) d\mathcal{H}^{n-1}y. \end{aligned} \quad (13)$$

Учитывая доказанное выше, из (13) мы получаем, что

$$1 \leq \int_{D_r^*} \rho_*^{n-1}(y) d\mathcal{A}_* \leq \sum_{i=1}^{\infty} \int_{f(S_r \cap B_i)} \rho_*^{n-1}(y) N(y, S_r \cap B_i) d\mathcal{H}^{n-1}y \quad (14)$$

для почти всех $r \in (0, r_0)$. Рассуждая покусочно на B_i , $i = 1, 2, \dots$, ввиду [16, 1.7.6 и теорема 3.2.5] и (12) мы получаем, что

$$\begin{aligned} \int_{B_i \cap S_r} \rho^{n-1} d\mathcal{A} &= \int_{B_i \cap S_r} \rho_*^{n-1}(f(x)) \left(|J(x, f)| \cdot K_I^{\frac{1}{n-1}}(x, f) \right)^{\frac{n-1}{n}} d\mathcal{A} = \\ &= \int_{B_i \cap S_r} \rho_*^{n-1}(f(x)) \cdot \frac{\left(|J(x, f)| \cdot K_I^{\frac{1}{n-1}}(x, f) \right)^{\frac{n-1}{n}}}{J_{n-1}f(x)} \cdot J_{n-1}f(x) d\mathcal{A} \geq \int_{B_i \cap S_r} \rho_*^{n-1}(f(x)) \cdot J_{n-1}f(x) d\mathcal{A} = \\ &= \int_{f(B_i \cap S_r)} \rho_*^{n-1} N(y, S_r \cap B_i) d\mathcal{H}^{n-1}y \end{aligned} \quad (15)$$

для почти всех $r \in (0, r_0)$. Из (14) и (15) вытекает, что $\rho \in \text{ext adm } \Gamma$.

Замена переменных на каждом B_l , $l = 1, 2, \dots$, (см., напр., [16, теорема 3.2.5]) и свойство счётной аддитивности интеграла приводят к оценке $\int_D \frac{\rho^n(x)}{K_I^{\frac{1}{n-1}}(x, f)} dm(x) \leq$

$\int_{f(D)} N(f, D) \cdot \rho_*^n(y) dm(y)$, что и завершает доказательство. $\square$

Замечание 2. Заключение леммы 3 при $n = 2$ остаётся справедливым для классов Соболева $W_{loc}^{1,1}$ при аналогичных условиях, за исключением дополнительного условия Кальдерона (2). Чтобы в этом убедиться, необходимо повторить доказательство этой леммы при $n = 2$, где необходимо учесть наличие N -свойства указанных отображений на почти всех окружностях, что обеспечивается свойством ACL для произвольных классов Соболева (см. [19, теорема 1, п. 1.1.3, § 1.1, гл. II]).

Имеет место следующее утверждение (см. [20, лемма 3.11] и [13, лемма 2.6, гл. III]).

Предложение 3. Для каждого $a > 0$ существует положительное число $\delta > 0$ такое, что $\text{сар}(\mathbb{B}^n, C) \geq \delta$, где C – произвольный континуум в $\mathbb{B}^n$ такой что $d(C) \geq a$.

Аналог следующей леммы в случае гомеоморфизмов доказан в монографии [2, теорема 9.3] (см. также работу [21, теорема 4.1]).

Лемма 4. Пусть $n \geq 2$, $x_0 \in D$ и $Q : D \rightarrow (0, \infty)$ – измеримая по Лебегу функция такая, что при некотором $\varepsilon_0 > 0$, $\varepsilon_0 < \text{dist}(x_0, \partial D)$, выполнено условие расходимости интеграла (3). Тогда каждое ограниченное открытое, дискретное и замкнутое в области $D \setminus \{x_0\}$ нижнее Q -отображение $f : D \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ продолжается в точку x_0 непрерывным образом до отображения $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, если $C(f, x_0) \cap C(f, \partial D) = \emptyset$.

Доказательство. Не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что $x_0 = 0$ и $\overline{f(D \setminus \{0\})} \subset \mathbb{B}^n$. Предположим противное, а именно, что отображение f не может быть продолжено по непрерывности в точку $x_0 = 0$. Тогда найдутся две последовательности x_j и x'_j , принадлежащие $D \setminus \{0\}$, $x_j \rightarrow 0$, $x'_j \rightarrow 0$, такие, что $|f(x_j) - f(x'_j)| \geq a > 0$ для всех $j \in \mathbb{N}$. Можно считать, что x_j и x'_j лежат внутри шара $B(0, r_0)$, $r_0 := \text{dist}(0, \partial D)$. Полагаем $r_j = \max\{|x_j|, |x'_j|\}$, $l_j = \min\{|x_j|, |x'_j|\}$. Соединим точки x_j и x'_j замкнутой кривой, лежащей в $\overline{B(0, r_j)} \setminus \{0\}$. Обозначим эту кривую символом C_j и рассмотрим конденсатор $E_j = (D \setminus \{0\}, C_j)$. В силу открытости и непрерывности отображения f , пара $f(E_j)$ также является конденсатором. Поскольку f – открытое и замкнутое отображение, $\partial f(D \setminus \{0\}) = C(f, \partial D) \cup C(f, 0)$.

Рассмотрим при $r_j < r < r_0$ проколотый шар $G_1 := B(0, r) \setminus \{0\}$. Заметим, что C_j – компактное подмножество G_1 , тогда $f(C_j)$ – компактное подмножество $f(G_1)$.

Ввиду открытости f имеет место включение $\partial f(G_1) \subset C(f, 0) \cup f(S(0, r))$, откуда ввиду замкнутости и открытости отображения f множество $\partial f(G_1) \setminus C(f, 0)$ является замкнутым в $\mathbb{R}^n$.

Отсюда вытекает, что множество $\sigma := \partial f(G_1) \setminus C(f, 0)$ отделяет $f(C_j)$ от $C(f, \partial D)$ в $f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, \partial D)$. Действительно,

$$f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, \partial D) = f(G_1) \cup \sigma \cup \left(f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, \partial D) \setminus \overline{f(G_1)} \right),$$

каждое из множеств $A := f(G_1)$ и $B := f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, \partial D) \setminus \overline{f(G_1)}$ открыто в топологии пространства $f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, \partial D)$, $A \cap B = \emptyset$, $C_0 := f(C_j) \subset A$ и $C_1 := C(f, \partial D) \subset B$.

Поскольку $\sigma \subset f(S(0, r))$, ввиду (6) и (7)

$$M(\Gamma(f(C_j), C(f, \partial D), f(D \setminus \{0\}))) \leq \frac{1}{M^{n-1}(f(\Sigma_r))}, \quad (16)$$

где Σ_r – семейство сфер $S(0, r)$, $r \in (r_j, r_0)$. С другой стороны, из леммы 2 и условия расходимости интеграла (3) вытекает, что $M^{n-1}(f(\Sigma_r)) \rightarrow \infty$ при $j \rightarrow \infty$. В таком случае, из (16) следует, что при $j \rightarrow \infty$

$$M(\Gamma(C(f, D), f(C_j), f(D \setminus \{0\}))) \rightarrow 0. \quad (17)$$

Аналогичную процедуру проделаем относительно предельного множества $C(f, 0)$. Имен-но, заметим, что C_j – компакт в $G_2 := D \setminus \overline{B(0, \varepsilon)}$ для произвольного $\varepsilon \in (0, l_j)$. Тогда ввиду непрерывности f множество $f(C_j)$ является компактным подмножеством

$f(G_2) = f(D \setminus \overline{B(0, \varepsilon)})$ и, в частности, $\partial f(D \setminus \overline{B(0, \varepsilon)}) \cap f(C_j) = \emptyset$. Далее, заметим, что $\partial f(D \setminus \overline{B(0, \varepsilon)}) \subset C(f, \partial D) \cup f(S(0, \varepsilon))$. Полагаем $\theta := \partial f(G_2) \setminus C(f, \partial D)$ и заметим, что θ является замкнутым, поскольку $\partial f(G_2) \subset f(S(0, \varepsilon)) \cup C(f, \partial D)$ и $C(f, \partial D) \cap f(S(0, \varepsilon)) = \emptyset$ ввиду замкнутости отображения f в $D \setminus \{0\}$. Кроме того, заметим, что θ отделяет $C_3 := f(C_j)$ и $C_4 := C(f, 0)$ в $f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, 0)$. Действительно,

$$f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, 0) = f(G_2) \cup \theta \cup \left(f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, 0) \setminus \overline{f(G_2)} \right),$$

$A = f(G_2)$ и $B = \left(f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, 0) \setminus \overline{f(G_2)} \right)$ открыты в топологии пространства $f(D \setminus \{0\}) \cup C(f, 0)$, $A \cap B = \emptyset$, $C_3 := f(C_j) \in A$ и $C_4 := C(f, 0) \in B$.

Так как $\theta \subset f(S(0, \varepsilon))$, ввиду (6) и (7) получаем:

$$M(\Gamma(f(C_j), C(f, 0), f(D \setminus \{0\}))) \leq \frac{1}{M^{n-1}(f(\Theta_\varepsilon))}, \quad (18)$$

где Θ_ε – семейство сфер $S(0, \varepsilon)$, $\varepsilon \in (0, l_j)$. С другой стороны, из леммы 2 и условия расходимости интеграла (3) вытекает, что $M^{n-1}(f(\Theta_\varepsilon)) = \infty$. В таком случае, из (18) следует, что

$$M(\Gamma(C(f, 0), f(C_j), f(D \setminus \{0\}))) = 0. \quad (19)$$

Заметим, что ввиду предложения 1 и полуаддитивности модуля семейств кривых (см. [22, разд. 6, гл. I]), при $j \rightarrow \infty$ из (17) и (19) вытекает, что

$$\begin{aligned} \text{cap } f(E_j) &\leq \\ &\leq M(\Gamma(C(f, 0), f(C_j), f(D \setminus \{0\}))) + M(\Gamma(C(f, \partial D), f(C_j), f(D \setminus \{0\}))) \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (20)$$

С другой стороны, по предложению 3 $\text{cap } f(E_j) \geq \delta > 0$ при всех натуральных j , что противоречит (20). Лемма доказана. $\square$

Доказательство теоремы 1 вытекает из лемм 3 и 4, а также того факта, что максимальная кратность $N(f, D)$ замкнутого открытого дискретного отображения f конечна (см., напр., [23, лемма 3.3]). $\square$

Теперь отдельно исследуем случай $n = 2$. Для этой цели напомним, что отображение $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{R}^n}$ называется *кольцевым Q -отображением в точке $x_0 \in D$* (см. [2]–[3]), если соотношение $M(f(\Gamma(S_1, S_2, A))) \leq \int_A Q(x) \cdot \eta^n(|x - x_0|) dm(x)$ выполнено для любого кольца $A = A(r_1, r_2, x_0)$, $0 < r_1 < r_2 < r_0 := \text{dist}(x_0, \partial D)$, и для каждой измеримой функции $\eta : (r_1, r_2) \rightarrow [0, \infty]$ такой, что $\int_{r_1}^{r_2} \eta(r) dr \geq 1$. Отметим, что кольцевые Q -гомеоморфизмы продолжаются по непрерывности в изолированные граничные точки, причём продолженное отображение также является гомеоморфизмом (см. [24, лемма 4 и теорема 4]).

Доказательство теоремы 2. Пусть f – отображение из условия теоремы, тогда, в частности, $f \in W_{loc}^{1,1}$, f – конечного искажения в $D \setminus \{z_0\}$, кроме того, f дискретно и открыто. Тогда согласно представлению Стоилова [25, п. 5 (III), гл. V], $f = \varphi \circ g$, где g

– некоторый гомеоморфизм, а φ – аналитическая функция. Заметим, что тогда также $g \in W_{loc}^{1,1}$ и, кроме того, g имеет конечное искажение.

Действительно, множество точек ветвления $B_\varphi \subset g(D \setminus \{z_0\})$ функции φ состоит только из изолированных точек (см. [25, пункты 5 и 6 (II), гл. V]). Следовательно, $g(z) = \varphi^{-1} \circ f$ локально, вне множества $g^{-1}(B_\varphi)$. Ясно, что множество $g^{-1}(B_\varphi)$ также состоит из изолированных точек, следовательно, $g \in ACL(D \setminus \{z_0\})$ как композиция аналитической функции φ^{-1} и отображения $f \in W_{loc}^{1,1}(D \setminus \{z_0\})$.

Покажем, что $g \in W_{loc}^{1,1}(D \setminus \{z_0\})$. Пусть далее $\mu_f(z)$ означает комплексную дилатацию функции $f(z)$, а $\mu_g(z)$ – комплексную дилатацию g . Согласно [10, (1), п. С, гл. I] для почти всех $z \in D \setminus \{z_0\}$ получаем:

$$f_z = \varphi_z(g(z))g_z, \quad f_{\bar{z}} = \varphi_z(g(z))g_{\bar{z}}, \quad (21)$$

$\mu_f(z) = \mu_g(z) =: \mu(z)$, $K_{\mu_f}(z) = K_{\mu_g}(z) := K_\mu(z) = \frac{1+|\mu|}{1-|\mu|}$. Таким образом, $K_\mu(z) \in L_{loc}^1(D \setminus \{z_0\})$. Поскольку f – конечного искажения, из (21) немедленно следует, что g также конечного искажения и при почти всех $z \in D \setminus \{z_0\}$ выполнены соотношения $|\partial g| \leq |\partial g| + |\bar{\partial} g| = K_\mu^{1/2}(z)(|J(f, z)|)^{1/2}$, откуда по неравенству Гёльдера $|\partial g| \in L_{loc}^1(D \setminus \{z_0\})$ и $|\bar{\partial} g| \in L_{loc}^1(D \setminus \{z_0\})$. Следовательно, $g \in W_{loc}^{1,1}(D \setminus \{z_0\})$ и g имеет конечное искажение.

В таком случае, g продолжается до гомеоморфизма $g : D \rightarrow \mathbb{C}$ ввиду [24, лемма 4 и теорема 4]. Тогда φ продолжается по непрерывности в точку $g(z_0)$ области $g(D)$ ввиду классической теоремы Пикара, что и доказывает теорему. $\square$

3. Некоторые следствия и замечания. Ещё один важный результат, относящийся к устранению особенностей классов Орлича–Соболева, касается функций конечного среднего колебания (см. [2] и [26]).

В дальнейшем нам понадобится следующее вспомогательное утверждение (см., напр., [2, лемма 7.4, гл. 7] либо [27, лемма 2.2]).

Предложение 4. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $Q(x)$ – измеримая по Лебегу функция, $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$, $Q \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$. Полагаем $A := A(r_1, r_2, x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : r_1 < |x - x_0| < r_2\}$ и $\eta_0(r) = \frac{1}{I r q_{x_0}^{\frac{n-1}{n-1}}(r)}$, где $I := I(x_0, r_1, r_2) = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r q_{x_0}^{\frac{n-1}{n-1}}(r)}$ и $q_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q(x) d\mathcal{H}^{n-1}$ – среднее интегральное значение функции Q над сферой $S(x_0, r)$. Тогда

$$\frac{\omega_{n-1}}{I^{n-1}} = \int_A Q(x) \cdot \eta_0^n(|x - x_0|) dm(x) \leq \int_A Q(x) \cdot \eta^n(|x - x_0|) dm(x) \quad (22)$$

для любой измеримой по Лебегу функции $\eta : (r_1, r_2) \rightarrow [0, \infty]$ такой, что $\int_{r_1}^{r_2} \eta(r) dr = 1$.

Будем говорить, что локально интегрируемая функция $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}$ имеет *конечное среднее колебание* в точке $x_0 \in D$, пишем $\varphi \in FMO(x_0)$, если $\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\Omega_n \varepsilon^n} \int_{B(x_0, \varepsilon)} |\varphi(x) - \bar{\varphi}_\varepsilon| dm(x) < \infty$, где $\bar{\varphi}_\varepsilon = \frac{1}{\Omega_n \varepsilon^n} \int_{B(x_0, \varepsilon)} \varphi(x) dm(x)$. Заметим, что, как известно, $\Omega_n \varepsilon^n = m(B(x_0, \varepsilon))$. Имеет место следующая

Теорема 3. Пусть $n \geq 3$, $x_0 \in D$, тогда каждое открытое, дискретное и замкнутое ограниченное отображение $f : D \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ класса $W_{loc}^{1,\varphi}(D \setminus \{x_0\})$ с конечным искажением такое, что $C(f, x_0) \cap C(f, \partial D) = \emptyset$, продолжается в точку x_0 непрерывным образом до отображения $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, если выполнено условие (2) и, кроме того, найдётся функция $Q \in L_{loc}^1(D)$, такая что $K_I(x, f) \leq Q(x)$ при почти всех $x \in D$ и $Q \in FMO(x_0)$.

Доказательство. Достаточно показать, что условие $Q \in FMO(x_0)$ влечёт расходимость интеграла (3), поскольку в этом случае необходимое заключение будет следовать из теоремы 1. Заметим, что для функций класса FMO в точке x_0

$$\int_{\varepsilon < |x| < e_0} \frac{Q(x + x_0) dm(x)}{\left(|x| \log \frac{1}{|x|}\right)^n} = O\left(\log \log \frac{1}{\varepsilon}\right) \quad (23)$$

при $\varepsilon \rightarrow 0$ и для некоторого $e_0 > 0$, $e_0 \leq \text{dist}(0, \partial D)$. При $\varepsilon_0 < r_0 := \text{dist}(0, \partial D)$ полагаем $\psi(t) := \frac{1}{t \log \frac{1}{t}}$, $I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt = \log \frac{\log \frac{1}{\varepsilon}}{\log \frac{1}{\varepsilon_0}}$ и $\eta(t) := \psi(t)/I(\varepsilon, \varepsilon_0)$. Заметим, что $\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \eta(t) dt = 1$, кроме того, из соотношения (23) вытекает, что

$$\frac{1}{I^n(\varepsilon, \varepsilon_0)} \int_{\varepsilon < |x| < \varepsilon_0} Q(x) \cdot \psi^n(|x|) dm(x) \leq C \left(\log \log \frac{1}{\varepsilon}\right)^{1-n} \rightarrow 0 \quad (24)$$

при $\varepsilon \rightarrow 0$. Из соотношений (22) и (24) вытекает, что интеграл вида (3) расходится, что и требовалось установить. $\square$

Следующее утверждение показывает, что в условиях теорем 1 и 3 требования на функцию Q нельзя, вообще говоря, заменить условием $Q \in L^p$ ни для какого (сколь угодно большого) $p > 0$ и для любой неубывающей функции $\varphi(t)$. Для простоты рассмотрим случай, когда $D = \mathbb{B}^n$, $n \geq 3$.

Теорема 4. Пусть $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ – произвольная неубывающая функция. Для каждого $p \geq 1$ существуют функция $Q : \mathbb{B}^n \rightarrow [1, \infty]$, $Q(x) \in L^p(\mathbb{B}^n)$ и равномерно ограниченный гомеоморфизм $g : \mathbb{B}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g \in W_{loc}^{1,\varphi}(\mathbb{B}^n \setminus \{0\})$, имеющий конечное искажение, такой что $K_I(x, f) \leq Q(x)$, при этом, g не продолжается по непрерывности в точку $x_0 = 0$.

Доказательство. Рассмотрим следующий пример. Зафиксируем числа $p \geq 1$ и $\alpha \in (0, n/p(n-1))$. Можно считать, что $\alpha < 1$ в силу произвольности выбора p . Зададим гомеоморфизм $g : \mathbb{B}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ следующим образом: $g(x) = \frac{1+|x|^\alpha}{|x|} \cdot x$. Заметим, что отображение g переводит шар $D = \mathbb{B}^n$ в кольцо $D' = B(0, 2) \setminus \mathbb{B}^n$, при этом, $C(g, 0) = \mathbb{S}^{n-1}$ (отсюда вытекает, что g не имеет предела в нуле). Заметим, что $g \in C^1(\mathbb{B}^n \setminus \{0\})$, в частности, $g \in W_{loc}^{1,1}$.

Далее, в каждой точке $x \in \mathbb{B}^n \setminus \{0\}$ отображения $g : \mathbb{B}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ вычислим внутреннюю дилатацию отображения g в точке x , воспользовавшись правилом (10). Поскольку g имеет вид $g(x) = \frac{x}{|x|} \rho(|x|)$, прямым подсчётом соответствующих производных по направлению можно убедиться, что в качестве главных векторов $e_{i_1}, \dots, e_{i_n}$ и $\widetilde{e}_{i_1}, \dots, \widetilde{e}_{i_n}$

можно взять $(n-1)$ линейно независимых касательных векторов к сфере $S(0, r)$ в точке x_0 , где $|x_0| = r$, и один ортогональный к ним вектор в указанной точке. Соответствующие главные растяжения (называемые, соответственно, *касательными растяжениями* и *радиальным растяжением*) равны $\lambda_r(x_0) := \lambda_{i_1}(x_0) = \dots = \lambda_{i_{n-1}}(x_0) = \frac{\rho(r)}{r}$ и $\lambda_r(x_0) := \lambda_{i_n} = \rho'(r)$, соответственно.

Согласно сказанному, $\lambda_r(x) = \frac{|x|^{\alpha+1}}{|x|}$, $\lambda_r(x) = \alpha|x|^{\alpha-1}$, $l(g'(x)) = \alpha|x|^{\alpha-1}$, $\|g'(x)\| = \frac{|x|^{\alpha+1}}{|x|}$, $|J(x, g)| = \left(\frac{|x|^{\alpha+1}}{|x|}\right)^{n-1} \cdot \alpha|x|^{\alpha-1}$ и $K_I(x, g) = \left(\frac{1+|x|^\alpha}{\alpha|x|^\alpha}\right)^{n-1}$. Заметим, что если G – произвольная компактная область в $\mathbb{B}^n \setminus \{0\}$, то $\|g'(x)\| \leq c(G) < \infty$, кроме того, нетрудно видеть, что $|\nabla g(x)| \leq n^{1/2} \cdot \|g'(x)\|$ при почти всех $x \in \mathbb{B}^n \setminus \{0\}$. Тогда ввиду неубывания функции φ выполнено: $\int_G \varphi(|\nabla g(x)|) dm(x) \leq \varphi(n^{1/2}c(G)) \cdot m(G) < \infty$, т.е., $g \in W^{1,\varphi}(G)$. Заметим, что отображение g имеет конечное искажение, поскольку его якобиан почти всюду не равен нулю; кроме того, $K_I(x, g) = Q(x)$, где $Q = \left(\frac{1+|x|^\alpha}{\alpha|x|^\alpha}\right)^{n-1}$, и $Q(x) \leq \frac{C}{|x|^{\alpha(n-1)}}$, $C := \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{n-1}$. Таким образом, получаем:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{B}^n} (Q(x))^p dm(x) &\leq C^p \int_{\mathbb{B}^n} \frac{dm(x)}{|x|^{p\alpha(n-1)}} = \\ &= C^p \int_0^1 \int_{S(0,r)} \frac{d\mathcal{A}}{|x|^{p\alpha(n-1)}} dr = \omega_{n-1} C^p \int_0^1 \frac{dr}{r^{(n-1)(p\alpha-1)}}. \end{aligned} \quad (25)$$

Хорошо известно, что интеграл $I := \int_0^1 \frac{dr}{r^\beta}$ сходится при $\beta < 1$. Таким образом, интеграл в правой части соотношения (25) сходится, поскольку показатель степени $\beta := (n-1)(p\alpha-1)$ удовлетворяет условию $\beta < 1$ при $\alpha \in (0, n/p(n-1))$. Отсюда вытекает, что $Q(x) \in L^p(\mathbb{B}^n)$. $\square$

Следующее утверждение содержит в себе заключение о том, что условие (3) является не только достаточным, но в некотором смысле и необходимым условием возможности непрерывного продолжения отображения в изолированную граничную точку.

Теорема 5. Пусть $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ – произвольная неубывающая функция и $0 < \varepsilon_0 < 1$. Для каждой измеримой по Лебегу функции $Q : \mathbb{B}^n \rightarrow [1, \infty]$, $Q \in L_{loc}(\mathbb{B}^n)$, такой, что $\int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t q_0^{\frac{1}{n-1}}(t)} < \infty$, найдётся ограниченное отображение $f \in W_{loc}^{1,\varphi}(\mathbb{B}^n \setminus \{0\})$ с конечным искажением, которое не может быть продолжено в точку $x_0 = 0$ непрерывным образом, при этом, $K_I(x, f) \leq \tilde{Q}(x)$ п.в., где $\tilde{Q}(x)$ – некоторая измеримая по Лебегу функция, такая что $\tilde{q}_0(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{S(0,r)} \tilde{Q}(x) d\mathcal{H}^{n-1} = q_0(r)$ для почти всех $r \in (0, 1)$.

Доказательство. Определим отображение $f : \mathbb{B}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ следующим образом: $f(x) = \frac{x}{|x|} \rho(|x|)$, где $\rho(r) = \exp \left\{ - \int_r^1 \frac{dt}{t q_0^{1/(n-1)}(t)} \right\}$. Заметим, что $f \in ACL$ и отображение f дифференцируемо почти всюду в $\mathbb{B}^n \setminus \{0\}$. Ввиду техники, изложенной перед формулировкой леммы 3, $\|f'(x)\| = \frac{\exp \left\{ - \int_{|x|}^1 \frac{dt}{t q_0^{1/(n-1)}(t)} \right\}}{|x|}$, $l(f'(x)) = \frac{\exp \left\{ - \int_{|x|}^1 \frac{dt}{t q_0^{1/(n-1)}(t)} \right\}}{|x| q_0^{1/(n-1)}(|x|)}$ и $|J(x, f)| =$

$$\frac{\exp\left\{-n \int_{|x|}^1 \frac{dt}{t q_0^{1/(n-1)}(t)}\right\}}{|x|^n q_0^{1/(n-1)}(|x|)}.$$
 Заметим, что $J(x, f) \neq 0$ при почти всех x , значит, f – отображение с конечным искажением. Кроме того, отметим, что $\varphi(|\nabla f(x)|) \in L_{loc}^1(\mathbb{B}^n \setminus \{0\})$, поскольку $\|f'(x)\|$ локально ограничена в $\mathbb{B}^n \setminus \{0\}$, а φ – неубывающая функция. Путём непосредственных вычислений убеждаемся, что $K_I(x, f) = q_0(|x|)$. Полагаем $\tilde{Q}(x) := q_0(|x|)$, тогда будем иметь, что $\tilde{q}_0(r) = q_0(r)$ для почти всех $r \in (0, 1)$. Наконец, заметим, что отображение f не может быть продолжено по непрерывности в точку $x_0 = 0$ ввиду конструкции этого отображения, а также условия $\int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t q_0^{1/(n-1)}(t)} < \infty$. $\square$

Список литературы

- [1] *Iwaniec T. and Martin G.* Geometrical Function Theory and Non-Linear Analysis. – Oxford: Clarendon Press, 2001. – 552 p.
- [2] *Martio O., Ryazanov V., Srebro U. and Yakubov E.* Moduli in Modern Mapping Theory. – New York: Springer Science + Business Media, LLC, 2009.
- [3] *Martio O., Ryazanov V., Srebro U. and Yakubov E.* Mappings with finite length distortion // J. d’Anal. Math. – 2004. – **93**. – P. 215–236.
- [4] *Gutlyanskii V. Ya., Ryazanov V. I., Srebro U., Yakubov E.* The Beltrami Equation: A Geometric Approach. – Developments in Mathematics, vol. 26. New York etc.: Springer, 2012.
- [5] *Gutlyanskii V. Ya. and Golberg A.* On Lipschitz continuity of quasiconformal mappings in space // J. d’Anal. Math. – 2009. – **109**. – P. 233–251.
- [6] *Golberg A and Salimov R.* Topological mappings of integrally bounded p -moduli // Ann. Univ. Buchar. Math. Ser. – 2012. – **3(LXI)**, no. 1. – P. 49–66.
- [7] *Vuorinen M.* Exceptional sets and boundary behavior of quasiregular mappings in n -space // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A 1. Math. Dissertationes. – 1976. – **11**. – P. 1–44.
- [8] *Ковтонюк Д.А., Рязанов В.И., Салимов Р.Р., Севостьянов Е.А.* К теории классов Орлича–Соболева // Алгебра и анализ. – 2013. – **25**, № 6. – С. 50–102.
- [9] *Calderon A.P.* On the differentiability of absolutely continuous functions // Riv. Math. Univ. Parma. – 1951. – **2**. – P. 203–213.
- [10] *Альфорт Л.* Лекции по квазиконформным отображениям. – Москва: Мир, 1969.
- [11] *Fuglede B.* Extremal length and functional completion // Acta Math. – 1957. – **98**. – P. 171–219.
- [12] *Gehring F.W.* Rings and quasiconformal mappings in space // Trans. Amer. Math. Soc. – 1962. – **103**. – P. 353–393.
- [13] *Rickman S.* Quasiregular mappings. – Results in Mathematic and Related Areas (3), 26. Berlin: Springer-Verlag, 1993.

- [14] *Zierner W.P.* Extremal length and conformal capacity // Trans. Amer. Math. Soc. – 1967. – **126**, no. 3. – P. 460–473.
- [15] *Hesse J.* A p -extremal length and p -capacity equality // Ark. Mat. – 1975. – **13**. – P. 131–144.
- [16] *Федерер Г.* Геометрическая теория меры. – Москва: Наука, 1987.
- [17] *Решетняк Ю.Г.* Пространственные отображения с ограниченным искажением. – Новосибирск: Наука, 1982.
- [18] *Kovtoniuk D. and Ryazanov V.* New modulus estimates in Orlicz-Sobolev classes // Annals of the University of Bucharest (mathematical series). – 2014. – **5 (LXIII)**. – P. 131–135.
- [19] *Мазья В.Г.* Пространства Соболева. – Ленинград: Издательство ленинградского университета, 1985. – 416 с.
- [20] *Martio O., Rickman S., Väisälä J.* Distortion and singularities of quasiregular mappings // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A1. – 1970. – **465**. – P. 1–13.
- [21] *Ковтонюк Д.А., Рязанов В.И.* К теории нижних Q -гомеоморфизмов // Укр. матем. вестник. – 2008. – **5**, № 2. – С. 159–184.
- [22] *Väisälä J.* Lectures on n -Dimensional Quasiconformal Mappings. – Lecture Notes in Math. **229**, Berlin etc.: Springer-Verlag, 1971.
- [23] *Martio O., Srebro U.* Periodic quasimeromorphic mappings // J. Analyse Math. – 1975. – **28**. – P. 20–40.
- [24] *Ломако Т.В.* О распространении некоторых обобщений квазиконформных отображений на границу // Укр. матем. ж. – 2009. – **61**, № 10. – С. 1329–1337.
- [25] *Стоилов С.* Лекции о топологических принципах теории аналитических функций. – Наука, Москва, 1964.
- [26] *Игнатъев А., Рязанов В.* Конечное среднее колебание в теории отображений // Укр. матем. вестник. – 2005. – **2**, № 3. – С. 395–417.
- [27] *Рязанов В.И., Севостьянов Е.А.* Равностепенно непрерывные классы кольцевых Q -гомеоморфизмов // Сиб. матем. ж. – 2007. – **48**, № 6. – С. 1361–1376.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Евгений Александрович Севостьянов

Житомирский государственный университет им. И. Франко

кафедра математического анализа, ул. Большая Бердичевская, 40

г. Житомир, Украина, 10 008

тел. +38 066 959 50 34 (моб.), e-mail: esevostyanov2009@mail.ru